

## Inhalation

### Warum Inhalieren?


Wenn Ihr Kind unter einer obstruktiven (engmachenden, verengenden) Bronchitis oder einem Asthma leidet, muss meistens eine Inhalationstherapie eingeleitet werden. Durch die Inhalation können die nötigen Medikamente direkt in die Bronchien gelangen und dort optimal wirken.

### Anwendung

- Schutzkappe am Spray entfernen
- Das Dosieraerosol gut schütteln
- Dosieraerosol in die Vorschaltkammeröffnung stecken
- Maske oder Mundstück dicht aufs Gesicht halten (Mund und Nase bedeckt, Augen ausserhalb der Maske)
- 1 x auf senkrecht gehaltenes Dosieraerosol drücken
- 5-10x durch waagrecht gehaltene Vorschaltkammer ein- und ausatmen
- Achten sie darauf, dass sich die Ventilkappen während der Atmung bewegen.

### Nach der Inhalation:

- Gesicht waschen um lokale Nebenwirkungen (Hautrötung, weissliche Pilzbeläge auf Schleimhäuten) zu vermeiden
- Kind etwas trinken oder essen lassen (um den Mund zu spülen um lokale Nebenwirkungen zu vermeiden) oder Zähne putzen



## Bestimmung Füllzustand Ventolin

### Ventolin® Dosieraerosol Bestimmung des Füllungszustands

**Patrone ohne Mundstück wiegen.**



<b>Patrone</b>	<b>Anzahl Dosen</b>
28 g	200 Dosen (voll)
25 g	150 Dosen
21 g	100 Dosen
18 g	50 Dosen
15 g	0 Dosen (leer)